

Decapeptyl-Depot / 데카펩틸-데포

 <p>사용 설명 동영상</p>	<p>제품명</p> <p>데카펩틸-데포 (트립토텔린아세트산염)</p>
	<p>원료약품 및 그 분량</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1관(172밀리그램) 중 - 유효성분: 트립토텔린아세트산염(별규) 4.12밀리그램 (트립토텔린으로서 3.75밀리그램) - 첨가제: D,L-락티드-글리콜리드공중합체, 프로필렌글라이콜디카프릴오카 프레이트 - 첨부용제(1관): 덱스트란70, 폴리소르베이트80, 염화나트륨, 인산이수소 나트륨, 수산화나트륨용액1N, 주사용수(용제)
	<p>의약품통합정보시스템</p> <p>의약품통합정보시스템 바로가기 ></p>

효능 및 효과

1. 혈청 중 성스테로이드치 저하를 필요로 하는 호르몬의존성 전립선암
2. 불임여성에서 체외수정시술 및 수정란 이식에서 성선호르몬 (사람폐경생식샘자극호르몬(hMG), 난포자극호르몬(FSH), 사람용모성 생식샘자극호르몬(hCG))과 병행하여 배란을 유도하기 위한 보조생식술
3. 자궁내막증
4. 자궁근종 등
5. 소아: 9세 이하 여아 및 10세 이하 남아의 중추성 사춘기조발증

용법 및 용량

1. 전립선암: 28~30일마다 트립토텔린으로서 3.75 mg을 근육주사
2. 자궁내막증, 자궁근종 : 생리주기 5일 이내에 트립토텔린으로서 3.75 mg을 4주마다 근육 또는 피하주사

3. 체외수정 시술 시 보조생식술 : 생리주기 3일 무렵에 트립토렐린으로서 3.75 mg을 4주마다 근육 또는 피하주사

4. 중추성 사춘기조발증 : 치료는 치료개시일 14일, 28일째에 트립토렐린 3.75 mg에 해당하는 1시린지로 시작한다,

그 후에는 4주에 한번씩 근육주사 또는 피하 주사한다. 만일 치료효과가 충분하지 않으면 3주에 한번씩 투여한다.

체중에 따라 용량을 조절해야 한다.

- 20 kg미만: 1.875 mg (1/2용량), 20~30kg: 2.5 mg (2/3 용량), 30 kg초과: 3.75 mg (1시린지)

- 치료는 골격 연령이 여아12세, 남아 13세 이상이면 중지해야 한다.