

**Firmagon 120mg / 퍼마곤주 120mg (데가렐릭스)**



**제품명**

퍼마곤주120밀리그램 (데가렐릭스)

**원료약품 및 그 분량**

- 주제 1바이알 중
- 유효성분: 데가렐릭스(별규) 128.0밀리그램
- 첨가제: 만니톨
- 첨부용제(1프리필드시린지): 주사용수(용제)
- 멸균주사침, 직접주입용의약품주입용기구

**의약품통합정보시스템**

[의약품통합정보시스템 바로가기 >](#)

**효능 및 효과**

호르몬 의존성 진행성 전립선암

**용법 및 용량**

1) 초기용량 : 데가렐릭스로서 240mg을 앞쪽 복벽에 피하주사한다.

2) 유지용량

초기 용량으로부터 한달이 지난 이후에 데가렐릭스로서 80mg을 4주 간격으로 앞쪽 복벽에 피하주사한다.

데가렐릭스는 혈청 테스토스테론의 급격한 초기 상승을 유도하지 않으므로 치료 초기에 혈청 테스토스테론의

급격한 초기 상승에 기인하는 이상반응을 예방하기 위한 항남성 호르몬요법을 실시할 필요는 없다

경증 또는 중등증의 신장애 및 간장애환자, 고령자의 경우 용량 조절이 필요하지 않다.

중증의 신장애 및 간장애 환자는 이들을 대상으로 실시한 임상 연구가 없으므로 주의해야 한다.