

▶ Glypressin / 글라이프레신 1밀리그램



▶제품명

글라이프레신1밀리그램 (테를리프레신아세트산염)

▶원료약품 및 그 분량

- 1바이알(11.0밀리그램) 중
- 유효성분: 테를리프레신아세트산염(별규) 1.0밀리그램 (테를리프레신으로서 0.86밀리그램)
- 첨가제: 만니톨, 염산
- 첨부용제(5mL, 앰플): 염산, 염화나트륨, 주사용수(용제)

▶의약품통합정보시스템

[의약품통합정보시스템 바로가기 >](#)

▶ 효능 및 효과

식도정맥류 출혈, 제1형 간신증후군

▶ 용법 및 용량

식도정맥류 출혈: 보통 성인의 경우 초기량으로 초산테를리프레신 1~2mg을 혈압 및 심박수를 관찰하면서 정맥주사하며, 유지량으로 이 약 1mg을 4~6시간마다 투여한다. 투여기간은 병의 경과에 따라 2일 또는 3일로 제한한다.

1일 최대투여량은 체중 kg당 20 μ g씩 6회이며, 혈압 및 심박수를 충분히 관찰한다.

제1형 간신증후군: 1일 3~4mg을 3~4회로 나누어 투여한다. 투여시작 3일후에도 혈청 크레아티닌의 감소가 나타나지 않으면 투여를 중단할 것이 권고된다. 혈청 크레아티닌 130 μ mol/L 이하, 또는 혈청 크레아티닌 치가 간신증후군으로 진단할 당시보다 적어도 30% 떨어질 때까지 사용하는 것이 이 처치법의 목표이다. 통상 10일간 치료한다.