

Minirin Injection / 미니린 주사액

	<p>제 품 명</p> <p>미니린주사액 (데스모프레신아세트산염)</p>
	<p>원료약품 및 그 분량</p> <p>1밀리리터 중 주성분: 데스모프레신아세트산염(EP) 4마이크로그램 (데스모프레신으로서 3.56마이크로그램) 첨가제: 주사용수(용제), 염산, 염화나트륨</p>
	<p>의약품통합정보시스템</p> <p>의약품통합정보시스템 바로가기 ></p>

효능 및 효과

- 1) 중추성 요붕증, 뇌손상 및 뇌하수체 수술로 인한 일시적인 다뇨, 번갈 다음
- 2) A형 혈우병 : 제 8인자 응고활성도가 5%보다 큰 A형 혈우병 환자에게 수술 전 출혈 예방제
- 3) 폰 빌레브란드 병 (Type I) : 제 8인자가 5%보다 큰 경증 및 중등도의 폰 빌레브란드병 (Type I)의 환자에게
수술 전 출혈 예방제
- 4) 신장 농축 능력의 측정

용법 및 용량

- 1) 중추성 요붕증, 뇌손상 및 뇌하수체 수술로 인한 일시적인 다뇨, 번갈 다음 :
 이 약은 각 환자의 반응에 따라 용량을 조절해야 한다. 반응은 수면시간, 수분교체에 따라 측정되며 보통 성인 및 12세 이상의 소아는 초산데스모프레신으로서 1일 2.0 μ g(0.5mL)-4.0 μ g(1mL)을 2회 분할하여 정맥투여한다. 아침 및 저녁의 용량은 수분전환의 주간리듬에 맞추어 각각 조절한다. 이 약 성분의 비강투여 환자가 비강흡수가 불량하거나 수술이 필요하여 주사제로 투여할 경우 동일한 항이뇨 작용을 위한 주사액의 용량은 비강투여량의 약 1/10이다. 비경구적 제제의 경우 투여 전 가능한 변색 여부 및 부유 입자를 육안으로 검사한다.
- 2) A형 혈우병 및 폰 빌레브란드 병 (Type I) :
 이 약으로서 체중 kg당 0.3-0.4 μ g을 생리식염주사액으로 희석(10kg 이상의 성인 및 소아 : 50mL, 10kg이하의 소아 : 10mL로 희석)하여 15-30분간 천천히 정맥주사한다. 투여 중 혈압 및

맥박을 관찰한다. 이 약을 수술 전에 투여시 수술 개시 30분전에 투여한다. 반복 투여나 다른 지혈용 혈액 제제의 사용 여부는 환자의 상태뿐만 아니라 임상시험 반응에 따라 결정되어야 한다. 반복투여시 반응 급강 현상이 나타날 수 있으므로 매 48시간보다 더 자주 투여시 이를 고려한다.

3) 신장 농축 능력의 측정 :

성인은 이 약으로서 $4\mu\text{g}(1\text{mL})$, 1세 이상의 유·소아는 $1-2\mu\text{g}(0.25-0.5\text{mL})$, 1세 미만의 영아는 $0.4\mu\text{g}(0.1\text{mL})$ 를 피하 또는 근육주사한다.