

**▶ Pentasa Sachet, Prolonged Release Granules, 2g / 펜타사서방과립2그램(메살라진)**

	<b>▶제품명</b>
	펜타사서방과립2그램(메살라진)
	<b>▶원료약품 및 그 분량</b>
	- 1포(2,120mg) 중 - 유효성분 : 메살라진(EP) - 첨가제 : 에틸셀룰로오스, 포비돈
	<b>▶의약품통합정보시스템</b>
	<a href="#">의약품통합정보시스템 바로가기 &gt;</a>

**▶ 효능 및 효과**

경증에서 중등도의 궤양성 대장염, 크론병의 치료

**▶ 용법 및 용량**

이 약은 씹어서 복용해서는 안된다. 내용물을 모두 혀 위에 부은 후 물이나 주스와 함께 삼켜야 한다.

**1. 궤양성 대장염**

성인은 급성발병시에는 메살라진으로서 1일 4g까지 1일 1회 또는 2~4회 분할하여 투여하며, 유지요법에는 1일 2g을 1일 1회로 경구투여한다.

만 6세 이상의 소아는 급성발병 시에는 1일 30~50mg/kg을, 유지요법에는 1일 15~30mg/kg을 분할하여 경구 투여한다.

소아 1일 최대용량이 성인 권장량을 초과해서는 안된다.

원칙적으로 40kg을 초과하지 않는 소아의 권장량은 성인의 절반 용량이며 40kg인 소아의 권장량은 성인의 일반 복용량에 해당한다.

**2. 크론병**

성인은 메살라진으로서 1일 4g까지를 분할하여 경구 투여한다. 만 6세 이상의 소아는 급성발병 시에는 1일 30~50mg/kg을, 유지요법에는 1일 15~30mg/kg을 분할하여 경구 투여한다. 원칙적으로 40kg을 초과하지 않는 소아의 권장량은 성인의 절반용량이며 40kg소아의 권장량 성인의 일반 복용량에 해당한다.