

<b>Minirin Melt 120mcg / 미니린멜트(설하정)</b>	
	<b>제품명</b> 미니린멜트설하정120마이크로그램 (데스모 프레신아세트산염)
	<b>원료약품 및 그 분량</b> - 1정(23밀리그램) 중 - 유효성분: 데스모프레신아세트산염(EP) 0.136밀리그램 (데스모프레신으로서 0.120밀리그램) - 첨가제: 만니톨, 무수구연산, 젤라틴
	<b>의약품통합정보시스템</b> <a href="#">의약품통합정보시스템 바로가기 &gt;</a>

<b>효능 및 효과</b>
일차성야뇨증(5세 이상), 야간다뇨와 관련이 있는 야간뇨증상의 치료(성인에 한함)

<b>용법 및 용량</b>
<p><b>1) 일차성 야뇨증(5세 이상) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취침시 데스모프레신으로서 120<math>\mu</math>g을 설하 투여한다. 효과가 충분하지 않을 경우 240<math>\mu</math>g까지 증량할 수 있다. 치료기간 중에는 수분섭취를 제한하여야 한다. 수분저류나 저나트륨혈증의 증후(두통, 구역/구토, 체중증가, 그리고 심한 경우는 경련)가 나타나는 경우에는 환자가 완전히 회복될 때까지 치료를 중단하여야 한다. 이약으로 치료를 다시 시작하고자 할 때는 엄격하게 수분섭취를 제한하여야 한다.</li> </ul> <p>치료의 지속여부는 투여 3개월 후 적어도 1주일간 투여를 중지한 상태에서 결정한다.</p> <p><b>2) 야간다뇨와 관련이 있는 야간뇨 증상의 치료(성인에 한함) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취침시 데스모프레신으로서 60<math>\mu</math>g을 설하 투여한다. 일주일 후에도 효과가 충분하지 않을 경우 120<math>\mu</math>g으로 증량하고, 계속하여 효과가 충분하지 않으면 일주일 간격으로 증량하여 240<math>\mu</math>g까지 사용할 수 있다. 치료기간 중에는 수분섭취를 제한하여야 한다. 용량결정 후 4주 이내에도 임상적인 효과가 없을 경우 투여를 중지한다.</li> </ul> <p>65세 이상 환자의 경우, 이 약으로 치료를 시작하는 것은 권장되지 않으며, 치료가 필요한 고령 환자의 경우, 혈청 나트륨 수치 등을 면밀히 모니터링한다. (사용상주의사항 중 5. 일반적주의 참고)</p>